

SERVICE D'ODONTOLOGIE - PARODONTOLOGIE

Examinateur :

Date:

No.:

[illegible]

A		Diagnostic dent par dent :
A:G.S.M.P.C.		G:Gingivite,S:Parodontite simple Superficielle,M:P ^{ite} simple Moyenne,P:P ^{ite} simple Profonde,C:P ^{ite} Complexe
Furc I,II,III		Lésion Interradiculaire : I, II, III selon Linde
GA.(GK-PP)		Gencive Attachée = (Gencive Kératinisée) moins (Profondeur de Poche)
JEC → G ± x		Distance de la Jonction-Emall-Cément au bord Gingival, + ou - selon accroissement ou recession gingivale .
Inflammation plaque	rouge	
saignement	colorer noir lors de présence rouge	
Niveau d'attache	c'est-à-dire : distance de la JEC au fond de la Poche Parodontale	
Profondeur de Poche	c'est-à-dire : distance du bord marginal de la gencive au fond de la Poche Parodontale	
Niveau d'attache		
saignement plaque		
Inflammation		
JEC → G ± x		
Mobilité	selon l'échelle de l'A R P A : I, II, III, IV	
D.O	Dentisterie Opératoire: DO ⁺ ou DO ⁻ selon reconstruction correcte ou non, C:Carie	
Proth.	Facteurs locaux Aggravants Prothèse: Pat ou Pa-, Pct ou Pc-: Prothèse conjointe ou adjointe correcte ou latrogène	
Oocl.	Occlusion: CP:contact prématuré,IF:interférence travaillante,CNT:contact non travaillant	
	V: diastème, → ou →:migrations, A: égression, A: Abrasion, F:Féture ou Fissure, <◇ lacune cunéiforme,E:Eruption	
	D: Désinclusion	
Mobilité		
GA.(GK-PP)		
JEC → G ± x		
Inflammation plaque		
saignement		
Niveau d'attache		
Profondeur de Poche		
Niveau d'attache		
saignement plaque		
Inflammation		
JEC → G ± x		
GA=(GK-PP)		
Furc I,II,III		
A.G.S.M.P.C.		